

**Per l'esecuzione di una diagnostica di base tramite POCT si richiedono:**

1) Analizzatore ematologico compatto di facile utilizzo che consenta l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico con la determinazione di almeno i seguenti parametri:

- Globuli bianchi
- Globuli rossi
- Emoglobina
- Ematocrito
- Volume corpuscolare medio (MCV)
- Concentrazione emoglobinica media (MCH)
- Concentrazione emoglobinica corpuscolare Media (MCHC)
- Coefficiente di distribuzione degli eritrociti (RDW)
- Piastrine
- Volume medio piastrinico (MPV)
- Linfociti in percentuale e in numero assoluto
- Monociti in percentuale e in numero assoluto
- Granulociti in percentuale e in numero assoluto

2) Strumento per emogasanalisi, compatto, di facile utilizzo che consenta, per singolo campionamento, la determinazione di almeno i seguenti parametri:

pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Cl<sup>-</sup>, Glu, Lac

3) Strumento o integrazione in uno degli strumenti ai punti 1) o 2), che consenta la determinazione della Proteina C Reattiva (PCR) con metodo immunoturbidimetrico.

Il Numero di test previsti è il seguente:

esame emocromocitometrico: 600 al mese

esame emogasanalisi: 600 al mese

esame Proteina C Reattiva: 600 al mese.